ORIGINAL

In Vitro Evaluation of the Antibacterial and Antioxidant Activity of Malva Sylvestris and Malva Pseudolavatera Malva Extracts

Evaluación in Vitro de la Actividad Antibacteriana y Antioxidante de los Extractos de Malva Sylvestris y Malva Pseudolavatera

Yesenia Anabell Abrigo Alvarado¹, Nixon Michael Goyes García¹, Patricia Jiménez Granizo¹, Glenda Sarmiento Tomalá¹

¹Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Guayaquil, Ecuador.

Citar como: Abrigo Alvarado YA, Goyes García NM, Jiménez Granizo P, Sarmiento Tomalá G. In Vitro Evaluation of the Antibacterial and Antioxidant Activity of Malva Sylvestris and Malva Pseudolavatera Malva Extracts. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:519. <https://doi.org/10.56294/hl2024.519>

Enviado: 05-04-2024

Revisado: 07-08-2024

Aceptado: 22-11-2024

Publicado: 23-11-2024

Editor: PhD. Prof. Neela Satheesh

ABSTRACT

In the present research work has done the evaluation of the antibacterial activity of aqueous and hydroalcoholic extracts of the leaves of *Malva sylvestris* and *Malva pseudolavatera*, against three microorganisms (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*) and antioxidant evaluation of hydroalcoholic extracts, with the goal to provide an alternative in the treatment of infectious and chronic degenerative diseases. The antibacterial activity was performed by disk diffusion assays using Cefotaxime as a reference antibiotic; The antioxidant activity was carried out by three in vitro methods, the method of FRAP (ferro-reducing capacity), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil (DPPH) and 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline)-6-sulfonic (ABTS•+). The results obtained indicated that the analyzed extracts of both *Malva* species showed a moderate antibacterial activity in certain concentrations against the microorganisms *E. coli*, *S. aureus* and *K. pneumoniae*; and taking into account the results of the antioxidant activity in the three in vitro methods tested, it was observed that as the concentration of the extracts increased, the reducing power (FRAP test) and the anti-radicals activity (DPPH and ABTS•+ tests) increased as well, manifesting a high antioxidant activity. As a consequence of this, we can conclude that *Malva sylvestris* and *Malva pseudolavatera* leaf extracts produce inhibition halos in the strains of the microorganisms evaluated (*E. coli*, *S. aureus*, *K. pneumoniae*), in addition to presenting inhibition of the radicals used (DPPH, ABTS•+) and ferro-reducing capacity (FRAP).

Keywords: Antibacterial; Antioxidant; *Malva Sylvestris*; *Malva Pseudolavatera*; Free Radicals.

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realizó la evaluación de la actividad antibacteriana de extractos acuosos e hidroalcohólicos de las hojas de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, contra tres microorganismos (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*) y la evaluación antioxidante de los extractos hidroalcohólicos, con la finalidad de brindar una alternativa en el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas. La actividad antibacteriana se realizó por ensayos de difusión en discos utilizando Cefotaxima como antibiótico de referencia; la actividad antioxidante se llevó a cabo mediante tres métodos in vitro, el método de FRAP (capacidad ferroreductora), 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico (ABTS•+). Los resultados obtenidos indicaron que los extractos analizados de ambas especies de *Malva* presentaron una actividad antibacteriana moderada en determinadas concentraciones frente a los microorganismos *E. coli*, *S. aureus* y *K. pneumoniae*; y teniendo en consideración los resultados de la actividad antioxidante en los tres métodos in vitro ensayados se pudo constatar que a medida que aumentaba la concentración de los extractos, aumentaba el poder reductor (ensayo FRAP) y la actividad antirradicalaria (ensayos DPPH y ABTS•+) de los mismos, manifestándose una elevada actividad antioxidante. Como consecuencia de esto, podemos concluir que los extractos de las hojas

de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera* producen halos de inhibición en las cepas de los microorganismos evaluados (*E. coli*, *S. aureus*, *K. pneumoniae*), además de presentar inhibición de los radicales empleados (DPPH, ABTS•+) y capacidad ferro-reductora (FRAP).

Palabras clave: Antibacteriana; Antioxidante; *Malva Sylvestris*; *Malva Pseudolavatera*; Radicales Libres.

INTRODUCCIÓN

Actualmente el uso de las plantas medicinales ha tomado mayor relevancia en las poblaciones rurales debido a que presentan una contribución muy importante en el sistema de salud.^(1,2,3,4,5,6) Ecuador se ha convertido en uno de los países con gran potencial en la medicina tradicional ya que tiene muchas variedades de plantas con muchos beneficios curativos que podrían ser utilizados para el tratamiento de múltiples enfermedades en las diferentes comunidades del país.^(7,8,9,10,11)

Se han realizado algunos estudios sobre la planta de *Malva*, en especial de la especie *sylvestris*,^(12,13,14,15) en donde se ha evaluado diferentes acciones farmacológicas y se ha podido observar que esta planta tiene acción antiinflamatoria, digestiva, antioxidante y cicatrizante, todo esto gracias a que posee varios metabolitos secundarios con gran actividad farmacológica, entre estos están: alcaloides, flavonoides, mucílagos, quinonas, saponinas, taninos, resinas, entre otros.^(16,17,18,19,20)

En los últimos años, las enfermedades infecciosas en piel y tejidos son un problema para los diferentes sitios de salud pública, en donde se emplea antibióticos como tratamiento, que en muchas ocasiones no siempre son administrados de forma adecuada y las infecciones persisten dando origen una resistencia bacteriana en el paciente tratado.^(21,22,23,24,25)

Debido a la resistencia antibacteriana que presentan muchos pacientes por el uso incorrecto de antibióticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el tratamiento de las enfermedades infecciosas con antibióticos un verdadero problema de salud pública que puede afectar a cualquier persona.^(26,27,28)

Como consecuencia de este fenómeno, enfermedades bacterianas que actualmente pueden ser tratadas podrían volverse incontrolables y propagarse de manera rápida a nivel global, por lo que se requiere corregir el uso incorrecto de antibióticos y a su vez emplear como alternativa el uso de plantas medicinales que puedan contribuir en el tratamiento de infecciones causadas por distintos microorganismos.^(29,30,31,32)

Por otra parte, debido a la presencia de ciertos metabolitos en plantas del género *Malva* es que se ha optado por evaluar también su actividad antioxidante para evitar la formación de radicales libres derivados de oxígeno, los cuales son causantes de diversas enfermedades crónico-degenerativas en los seres humanos y son de relevancia clínica significativa. Los radicales libres son moléculas químicas que presentan un electrón en el orbital externo libre, y esto produce una configuración espacial poco estable; son muy reactivos y tienen una vida media corta.^(33,34,35,36)

Los seres humanos poseen sistemas de defensa naturales (antioxidantes) dentro del organismo que impiden que se generen efectos nocivos por la presencia de los radicales libres, neutralizándolos. Sin embargo, cuando hay un déficit de antioxidantes en el organismo, no tienen la capacidad de equilibrar los radicales libres y estos pueden provocar efectos dañinos, como lo es el estrés oxidativo (daño celular).^(37,38,39,40)

En el presente trabajo se pretende emplear dos especies del género *Malva*, *sylvestris* y *pseudolavatera*, para evaluar su actividad antibacteriana y antioxidante, realizando una comparación entre ambas y a su vez brindar una alternativa en el tratamiento de enfermedades infecciosas y cancerígenas.

¿Cuáles serán los diámetros de los halos de inhibición y disminución de radicales libres que presentan los extractos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*?

Objetivo

Evaluar la actividad antibacteriana y antioxidante de los extractos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera* en diferentes concentraciones.

MÉTODO

Tipo de investigación

La investigación es de carácter hipotético, cuantitativo y experimental, sobre la actividad antibacteriana y antioxidante de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*. Debido que al inicio del estudio se planteó una hipótesis, el cual a través de la experimentación de los ensayos in vitro y cuantificación de los resultados obtenidos será aceptada o rechazada, indicando si alguna de las dos especies de *Malva* presenta actividad antibacteriana o antioxidante.

Equipos, Materiales y Reactivos
Equipos

Tabla 1. Equipos utilizados en el análisis	
Equipos utilizados para la actividad antibacteriana	Equipos utilizados para la actividad antioxidante
Molino eléctrico marca IKA MF10 BASIC Balanza analítica marca Shimadzu Incubadora marca memmert Contador de colonias manual de campo oscuro marca Reichert Technologies Refrigeradora marca Durex	Espectrofotómetro UV-visible marca Thermo Spectronic modelo Genesys 20

Materiales

Materiales utilizados para la actividad antibacteriana	Materiales utilizados para la actividad antioxidante
<ul style="list-style-type: none"> - Cajas Petri con agar Muller Hinton - Cajas Bipetri con Agar sangre - manitol - Micropipeta automática de 5 - 1000µL - Punta para pipeta color azul (50 - 1000 µL). - Hisopos - Jeringas 1mL - Asa - Matraces volumétricos - Agitadores - Vasos de precipitación - Tubos de ensayo - Probeta 	<ul style="list-style-type: none"> - Vasos de precipitación - Micropipeta automática de 5 - 1000µL - Punta para pipeta color azul (50- 1000 µL). - Cubetas de caras paralelas (1cm) - Papel absorbente

Figura 1. Materiales usados

Material vegetal y biológico

Tabla 2. Material vegetal y biológico	
Material vegetal	Material biológico
Malva sylvestris	Cepas de Escherichia coli ATCC 25922
Malva pseudolavatera	Cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923
	Cepas de Klebsiella pneumoniae ATCC 700603

Reactivos

Tabla 3. Reactivos que se utilizaron en el análisis			
Actividad antibacteriana	Actividad antioxidante		
	FRAP	DPPH	ATBS
Etanol			
Caldo de infusión cerebro corazón (BHI)	Acetato de sodio anhidro	DPPH (2,2difetil-1-picrilhidracilo)	ABTS (ácido2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico)
Reactivo de Mcfarland	Ácido acético (99,7 %)	Etanol absoluto	Persulfato de potasio
Suero fisiológico	2,4,6-tripiridil-s- triazina (TPTZ)	Ácido ascórbico (99 % pureza) (sustancia de referencia)	Etanol al 96 %
Discos de Cefotaxima 30 mcg	Ácido clorhídrico (37 %)	Trolox (sustancia de referencia)	Ácido ascórbico (99 % pureza) (sustancia de referencia)
Discos blancos	FeCl3		
	FeSO4 x 7 H2O (sustancia de referencia)		
	Ácido ascórbico (99 % pureza), (sustancia de referencia)		

Muestra

Tabla 4. Muestra: actividad antibacteriana y antioxidante			
Actividad antibacteriana	Actividad antioxidante		
Extractos acuosos de <i>Malva sylvestris</i> y <i>Malva pseudolavatera</i> al 2,5 - 5 y 10 %.	FRAP	DPPH	ATBS
Extractos hidroalcohólicos de <i>Malva sylvestris</i> (0,16 mg/10µL - 0,32 mg/20µL y 0,48 mg/30µL) y <i>Malva pseudolavatera</i> (0,30 mg/10µL - 0,60 mg/20µL y 0,90 mg/30µL)	Extractos hidroalcohólicos al 80 % de <i>Malva sylvestris</i> y <i>Malva pseudolavatera</i>		
	Concentraciones: 25, 100, 150 y 200 µg/mL	Concentraciones: 25, 50, 100, 200, 300, 400 y 500 µg/mL	Concentraciones: 100, 200, 300, 400 y 500 µg/mL

Metodología Experimental

Figura 2. Metodología de la actividad antimicrobiana y antioxidante

Recolección y selección de especies de Malva

La recolección de las especies vegetales constituidas por *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, fueron obtenidas en la provincia de Chimborazo, cantón Guano y seleccionadas con el fin de establecer una comparación de la actividad antibacteriana y antioxidante de ambas especies.

Secado de las especies vegetales

Las dos especies de *Malva* fueron previamente limpiadas de sus impurezas y se procedió a exponerlas a un secado natural sin exposición del sol.

Pulverización y almacenamiento

Luego del secado natural, se deshojó las plantas de ambas especies, las hojas se llevaron a la estufa por un periodo de 2h a 50°C. Posteriormente las hojas fueron trituradas en el molino eléctrico marca IKA MF10 BASIC a 3500 rpm. Una vez obtenido el pulverizado de ambas especies se dejaron almacenadas en funda ziploc a temperatura de refrigeración, para luego ser utilizado en la obtención del extracto hidroalcohólico.

Obtención del extracto acuoso de ambas especies

A partir de las muestras vegetales liofilizadas de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, se procedió a pesar la cantidad necesaria para las concentraciones establecidas (2,5 %, 5 % y 10 %) y para su disolución se empleó agua destilada. El extracto fue preparado el mismo día del análisis.

Obtención del extracto hidroalcohólico de ambas especies

A partir de las muestras vegetales pulverizadas de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, se procedió a pesar 50 g de polvo de cada una de las especies, se la humectó con 60 mL de solución hidroalcohólica (50:50) y se dejó macerar durante 48 horas con 150 mL de la misma solución hidroalcohólica a temperatura ambiente. Luego se filtró, se midió el volumen obtenido y se calculó su concentración.

Cálculo de la concentración de los extractos

Para calcular la concentración se tomó una alícuota de 5 mL, se la colocó en una cápsula previamente tarada, se dejó evaporar a sequedad en baño de agua y se pesó nuevamente.

Actividad antibacteriana

La evaluación de la actividad antibacteriana de los extractos obtenidos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, se realizó mediante un análisis *in vitro*, utilizando el método de difusión en disco o también llamado técnica de Kirby- Bauer.

Preparación de las concentraciones de los extractos

Extracto acuoso

En diferentes vasos de precipitación, se trabajó con soluciones del extracto a diferentes concentraciones (2,5 %, 5 %, 10 %), para lo cual se realizaron cálculos a partir del liofilizado de ambas especies y se lo disolvió en 3 mL de agua destilada.

Extracto hidroalcohólico

A partir del extracto hidroalcohólico obtenido, se procedió a preparar las diferentes concentraciones del extracto de acuerdo con la especie vegetal, obteniendo en *Malva sylvestris* las siguientes concentraciones en volúmenes diferentes (0,16 mg/10µL - 0,32 mg/20µL y 0,48 mg/30µL) y en *Malva pseudolavatera* (0,30 mg/10µL - 0,60 mg/20µL y 0,90 mg/30µL).

Activación de los microorganismos

Se realizó la siembra de los microorganismos antes de cada análisis, a partir de una cepa pura (*E. coli* ATCC 25922, *S. aureus* ATCC 25923, *K. pneumoniae* ATCC 700603) de cada uno, en cajas bipetri con agar Manitol (*S. aureus*) y agar Sangre (*E. coli* y *K. pneumoniae*); luego se las rotuló respectivamente y fueron colocadas en la incubadora a 37 °C durante 24 h.

Preparación y suspensión del inóculo

Se seleccionaron 4 ó 5 colonias de cada microorganismo del cultivo puro obtenido en la activación de microorganismos, se transfirieron las colonias utilizando un hisopo a un tubo estéril que contenía 3 mL de solución salina estéril, y se ajustó el inóculo a una turbidez equivalente al tubo 0,5 de la escala de McFarland, el cual corresponde a 108 microorganismos viables por mL.

Siembra de microorganismos

Se sumergió un hisopo estéril en la suspensión del inóculo y el exceso de líquido fue eliminado por rotación del hisopo contra las paredes del tubo de ensayo, luego se realizó la siembra en tres o cuatro direcciones sobre toda la superficie del medio de agar Mueller Hinton, girando dicha caja en ángulos de 90°.

Extracto acuoso

Se colocaron 20 µL de cada concentración del extracto acuoso sobre discos en blanco de la marca Oxoid™ de 6 mm de diámetro, como control negativo se utilizó un disco en blanco con 20 µL de agua destilada y como control positivo (referencial) un disco de Cefotaxima; realizando cinco repeticiones. Las cajas Petri fueron debidamente rotuladas e incubadas a 37 °C durante 24 horas.

Extracto hidroalcohólico

Se colocaron tres volúmenes diferentes con sus respectivas concentraciones sobre discos en blanco de la marca Oxoid™ de 6 mm de diámetro; como control negativo se utilizó un disco en blanco con 20 µL de solución hidroalcohólica (50:50) y como control positivo (referencial) un disco de Cefotaxima; realizando cinco repeticiones. Las cajas Petri fueron debidamente rotuladas e incubadas a 37°C durante 24 horas.

Medición de la zona del halo de inhibición

Para la interpretación de los resultados, se midió la zona de inhibición redondeando al perímetro más cercano al disco con una regla milimetrada, manteniendo la caja sobre el contador de colonias manual de campo oscuro de Quebec marca Reichert Technologies para medir con claridad el halo de inhibición, y luego se comparó con las medidas estandarizadas del control positivo por el CLSI de cada uno de los microorganismos utilizados.

Actividad antioxidante

Actividad antioxidante por el método de FRAP (capacidad ferro- reductora).

La capacidad de reducción de los extractos hidroalcohólicos fue medida acorde al procedimiento descrito por Benzie y Strain (1996). Las determinaciones fueron de carácter espectrofotométrico, se empleó un espectrofotómetro UV- visible a una absorbancia de 593 nm.

Concentraciones de los extractos

Los extractos hidroalcohólicos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera* al 80 % fueron a las concentraciones de 25, 50, 100, 150 y 200 µg/mL.

Preparación de la solución FRAP

Para conformar el reactivo de FRAP, se mezcló buffer acetato de sodio 300 mM (pH 3,6), 10 mM de TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-triazina) y 20 mM de cloruro férrico (25:2,5:2,5 v:v:v).

Evaluación de la actividad antioxidante

Se tomaron 30 µL de cada dilución de los extractos (a las concentraciones de 25, 50, 100, 150 y 200 µg/mL) y se mezclaron con 900 µL de la disolución FRAP y 90 µL de agua destilada. Una vez realizada la mezcla, la reacción que ocurre mide la reducción del complejo férrico-TPTZ, en la cual el hierro férrico (Fe³⁺ - TPTZ) se reduce a ión ferroso a bajo pH, causando la formación de un complejo ferroso-tripiridil-triazina (Fe²⁺ - TPTZ) de color azul intenso con un máximo de absorción a una longitud de onda de 593 nm. El blanco consistió en 120 µL de agua y 900 µL de reactivo. Cada determinación se llevó a cabo por triplicado.

Los resultados fueron expresados como µmol equivalentes de ácido ascórbico (EAA) y como µmol equivalentes de FeSO₄, a partir del cálculo interpolando la densidad óptica (D.O) de las muestras en las curvas de calibración de ambas sustancias de referencia a las concentraciones de 100, 200, 400, 500 y 800 µM. Las lecturas se realizaron por triplicado a los cuatro minutos.

Capacidad secuestradora del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH)

Para la evaluación de la actividad antioxidante de los extractos obtenidos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, se realizó mediante la técnica del radical libre DPPH (radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo), basado en la metodología descrita por Brand-Willians et al., se empleó un espectrofotómetro UV-visible y las determinaciones fueron medidas a 517 nm al cabo de los 30 minutos.

Concentraciones de los extractos

Los extractos hidroalcohólicos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera* fueron al 80 % en concentraciones de 25, 50, 100, 150 y 200 µg/mL.

Preparación de la solución de DPPH

La solución de DPPH fue preparada a una concentración de 0,075mg/mL en un matraz aforado cubierto con aluminio, empleando como solvente el metanol. Esta solución se debe preparar el mismo día que se va a realizar el ensayo dado que es una solución fotosensible. La solución debe almacenarse en un frasco color ámbar y mantenerse fuera del alcance de la luz.

Preparación del control positivo y control negativo

El control positivo utilizado en el ensayo de actividad antioxidante fue el ácido ascórbico en concentraciones de 25, 50, 100, 150 y 200 µg/mL utilizando como solvente el etanol absoluto.

El control negativo o blanco consistió en una mezcla de 900 µL de DPPH Y 100 µL de etanol absoluto.

Evaluación de la actividad antioxidante

Se tomaron 10 µL de cada concentración de los extractos (25, 50, 100, 150 y 200 µg/mL) y de las sustancias de referencia a las mismas concentraciones, se mezclaron con 900 µL del reactivo DPPH (0,075 mg/mL) y 90 µL de etanol absoluto. La reacción se dejó en la oscuridad durante 30 minutos en un espectrofotómetro y posteriormente se leyeron las muestras a una longitud de onda de 517 nm. Cada determinación se llevó a cabo por triplicado.

Los resultados fueron expresados como porcentaje de inhibición del radical DPPH según la siguiente fórmula:

$$\% DPPH = \frac{(Ab - Am)}{Ab} \times 100$$

Donde:

Ab: Absorbancia del blanco (nm)

Am: Absorbancia de la muestra (nm)

Ensayo del ABTS•+ (ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina)-6- sulfónico)

Para la evaluación de la actividad antioxidante de los extractos obtenidos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, se realizó mediante la técnica del radical libre ABTS•+ (ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico), se empleó un espectrofotómetro UV-visible y las determinaciones fueron medidas a 734 nm al cabo de los 30 minutos.

Concentraciones de los extractos

Los extractos hidroalcohólicos al 80 % de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera* a las concentraciones de 100, 200, 300, 400 y 500 µg/mL.

Preparación de la solución ABTS•+

El ensayo fue basado en la habilidad de diferentes sustancias de secuestrar el radical catiónico ABTS•+, el cual fue preparado mezclando una solución de ABTS 7mM y persulfato de potasio 2,45 mM (1/1, v/v). La mezcla se mantuvo en la oscuridad por 16 horas para la formación del radical. La solución ABTS•+ fue diluida con etanol al 96 % hasta lograr una absorbancia de $0,700 \pm 0,05$ a 734nm.

Evaluación de la actividad antioxidante

Se tomaron 980 µL de la solución de ABTS•+ radicalico con 20 µL de los extractos ensayados y la sustancia de referencia (ácido ascórbico) a las concentraciones de 100, 200, 300, 400 y 500 µg/mL. Se incubó por 30 min para su posterior lectura a 734 nm en un espectrofotómetro UV- visible. Cada determinación se llevó a cabo por triplicado.

Los resultados se expresaron como porcentaje de inhibición del radical ABTS•+ según la fórmula siguiente:

$$\% \text{ de inhibición} = \frac{[A_{734} (\text{ABTS}) - A_{734} (\text{antioxidante})]}{A_{734} (\text{ABTS})} \times 100$$

RESULTADOS

Recolección de datos

A continuación, se detalla los resultados obtenidos mediante la evaluación de la actividad antibacteriana y antioxidante de los extractos de la *M. sylvestris* y *M. pseudolavatera*.

Resultados: Actividad antibacteriana

En las tablas 5, 6, 7, 8, se muestran los resultados de los dos extractos estudiados (acuoso e hidroalcohólico) para evaluar la actividad antibacteriana de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera* contra *E. coli*, *S. aureus* y *K. pneumoniae*.

Malva sylvestris

Extracto acuoso

En la evaluación de la actividad antibacteriana del extracto acuoso en el cual se realizó a partir de tres concentraciones (2,5 %, 5 % y 10 %) contra *E. coli*, *S. aureus* y *K. pneumoniae*. Se demostró que en ninguna de las tres concentraciones evaluadas frente a *E. coli* y *S. aureus* inhibió el crecimiento de los microorganismos utilizados, pero si presenta una mínima inhibición del crecimiento bacteriano de *K. pneumoniae* en la concentración 5 % presentando un halo de 8 mm. y en la concentración al 10 % se obtuvo un halo de 7mm. resultados que se reflejan en la tabla 7.

En cuanto los diámetros obtenidos de los halos de inhibición del control positivo utilizado en este caso fue Cefotaxima, están dentro de los patrones estándar de halo de inhibición establecidos por NCCLS, 2000.

Tabla 5. Valores de halo de inhibición del extracto acuoso de *M. sylvestris* y controles

Microorganismos	Concentraciones			Controles	
	2,5 %	5 %	10 %	C+ (CTX)	C-
E. coli	-	-	-	29 mm	-
	-	-	-	28 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
Promedio	-	-	-	29 mm	-
S. aureus	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	29 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	29 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
Promedio	-	-	-	29 mm	-
K. pneumoniae	-	-	-	18 mm	-
	-	7 mm	8 mm	17 mm	-
	-	-	7 mm	18 mm	-
	-	8 mm	7 mm	18 mm	-
	-	-	-	18 mm	-
Promedio	-	8 mm	7 mm	17 mm	-

A continuación, se presentan fotografías más representativas de los resultados obtenidos del extracto acuoso de *Malva sylvestris* frente a cada microorganismo.

Escherichia coli

Figura 7 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – extracto acuoso 2.5%

Figura 8 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – extracto acuoso 5%

Figura 9 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – extracto acuoso 10%

Figura 10 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – Controles

Figura 3. Antibiogramas obtenidos de los extractos acuosos de *Malva sylvestris* en las concentraciones de 2,5 - 5 y 10 % frente a *Escherichia coli*

En la figura figura 3 se puede observar los resultados de los antibiogramas obtenidos de los extractos acuosos de *Malva sylvestris* en las concentraciones de 2,5 - 5 y 10 %, frente a *Escherichia coli*, en el cual no se presenta ningún halo de inhibición, es decir que los extractos acuosos de *Malva sylvestris* a las tres concentraciones de estudio no presentan actividad antibacteriana contra *Escherichia coli* en comparación con el antibiótico de referencia.

Staphylococcus aureus

En la figura figura 4 se reflejan los resultados obtenidos de los antibiogramas de los extractos acuosos de *Malva sylvestris* en las concentraciones de 2,5 - 5 y 10 %, frente a *Staphylococcus aureus*, en el cual se observan que no se presenta ningún algo de inhibición, es decir que los extractos acuosos de *Malva sylvestris* a las concentraciones de 2,5 - 5 y 10 %, no presentan actividad antibacteriana contra *Staphylococcus aureus* en comparación con el antibiótico de referencia.

Figura 11 Antibiograma *S. aureus* – *M. sylvestris* – extracto acuoso 2.5%

Figura 12 Antibiograma *S. aureus* – *M. sylvestris* – extracto acuoso 5%

Figura 13 Antibiograma *S. aureus* – *M. sylvestris* – extracto acuoso 10%

Figura 14 Antibiograma *S. aureus* – *M. sylvestris* – extracto acuoso - Controles

Figura 4. Antibiogramas de los extractos acuosos de *Malva sylvestris* en las concentraciones de 2,5 - 5 y 10 % frente a *Staphylococcus aureus*

Klebsiella pneumoniae

En las fotografías figure 5 se observa los resultados obtenidos de los antibiogramas de los extractos acuosos de *Malva sylvestris* en las concentraciones de 2,5 - 5 y 10 % en réplicas de cinco, frente a *Klebsiella pneumoniae*, en la concentración de 5 % presenta halo de inhibición de 8 mm y en la concentración de 10 % presenta halo de inhibición de 7 mm, es decir que los extractos acuosos de *Malva sylvestris* a las concentraciones de 5 y 10 %, presentan una moderada actividad antibacteriana contra *Klebsiella pneumoniae* en comparación con el antibiótico de referencia.

Figura 15 Antibiograma *K. pneumoniae* - *M. sylvestris* - extracto acuoso 2.5%

Figura 16 Antibiograma *K. pneumoniae* - *M. sylvestris* - extracto acuoso 5%

Figura 17 Antibiograma *K. pneumoniae* - *M. sylvestris* - extracto acuoso - Control +

Figura 5. Antibiogramas de los extractos acuosos de *Malva sylvestris* en las concentraciones de 2,5 - 5 y 10 % frente a *Klebsiella pneumoniae*

Extracto hidroalcohólico

Tabla 6. Valores de halo de inhibición del extracto hidroalcohólico de *M. sylvestris* y controles

Microorganismos	Concentraciones			Controles	
	0,16 mg/10µL	0,32 mg/20µL	0,48 mg/30µL	C+ (CTX)	C-
<i>E. coli</i>	-	7 mm	7 mm	29 mm	-
	-	-	-	28 mm	-
	-	-	8 mm	30 mm	-
	-	-	7 mm	30 mm	-
	-	-	7 mm	30 mm	-
Promedio	-	-	7 mm	29 mm	-
<i>S. aureus</i>	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	29 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	7 mm	-	29 mm	-
Promedio	-	-	7 mm	30 mm	-
<i>K. pneumoniae</i>	-	7 mm	-	18 mm	-
	-	-	7 mm	17 mm	-
	-	7 mm	-	18 mm	-
	-	7 mm	-	18 mm	-
	-	8 mm	7 mm	18 mm	-
Promedio	-	7 mm	7mm	17 mm	-

Para la evaluación de la actividad antibacteriana del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris* se determinó en tres concentraciones diferentes (0,16 mg/10µL - 0,32 mg/20µL y 0,48 mg/30µL) contra *E. coli*, *S. aureus* y

K. pneumoniae. Se demostró que a la concentración de 0,16mg/10µL del extracto no presentó inhibición de crecimiento microbiano de ninguno de los microorganismos mencionados, a la concentración de 0,32mg/20µL presentó una moderada actividad contra *Klebsiella pneumoniae* con un halo de 7 mm, y a la concentración de 0,48mg/30µL presentó una moderada actividad de inhibición contra *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*, mostrando halos de 7 mm (ver tabla 6).

A continuación, se presentan imágenes más representativas de los resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris*.

Escherichia coli

En la figura 6 se reflejan los resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris* frente a *Escherichia coli*, en el cual solo presenta una moderada actividad de inhibición en la concentración 0,48mg/30µL con un halo de 7 mm.

Figura 18 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico 0.16mg/10µL

Figura 19 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico 0.32mg/20µL

Figura 20 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico

Figura 21 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico (Control)

Figura 22 Antibiograma *E. coli* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico (Control +)

Figura 6. Resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris* frente a *Escherichia coli*

Staphylococcus aureus

En la figura 7, se reflejan los resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris* frente a *Staphylococcus aureus*, en el cual no presenta actividad de inhibición en ninguna concentración.

Figura 23 Antibiograma *S. aureus* *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico 0.16mg/10µL

Figura 24 Antibiograma *S. aureus* *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico 0.32mg/20µL

Figura 25 Antibiograma *S. aureus* *M.*

Figura 26 Antibiograma *S. aureus* *M.*

Figura 7. Resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris* frente a *Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae

En la figura 8 se reflejan los resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris* frente a *Klebsiella pneumoniae*, en el cual no presenta actividad de inhibición en la concentración 0,16mg/10µL, pero si presenta actividad moderada en las concentraciones 0,32mg/20µL y 0,48mg/30µL, mostrando halos de 7 mm.

Figura 27 Antibiograma *K. pneumoniae* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico 0.16mg/10µL

Figura 28 Antibiograma *K. pneumoniae* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico 0.32mg/20µL

Figura 29 Antibiograma *K. pneumoniae* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico 0.48mg/30µL

Figura 30 Antibiograma *K. pneumoniae* – *M. sylvestris* – Extracto Hidroalcohólico (Control+)

Figura 8. Resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva sylvestris* frente a *Klebsiella pneumoniae*

Malva pseudolavatera

Extracto acuoso

Los resultados obtenidos por el método de Kirby-Bauer o difusión en disco, demostraron que las bacterias gram-negativas (*E.coli* y *K. pneumoniae*) y gram- positivas (*S. aureus*) no presentaron halos de inhibición, en ninguna de las concentraciones (2,5 %, 5 %, 10 %) de los extractos acuosos analizados. Se consideró como control positivo cefotaxima y como control negativo el agua destilada. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7.

Tabla 7. Valores de halo de inhibición del extracto acuoso de *M. pseudolavatera* y controles

Microorganismos	Concentraciones			Controles	
	2,5 %	5 %	10 %	C+ (CTX)	C-
<i>E. coli</i>	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	29 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
Promedio	-	-	-	29,8 mm	-
<i>S. aureus</i>	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	28 mm	-
	-	-	-	29 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	28 mm	-
Promedio	-	-	-	29 mm	-
<i>K. pneumoniae</i>	-	-	-	18 mm	-
	-	-	-	17 mm	-
	-	-	-	18 mm	-
	-	-	-	18 mm	-
	-	-	-	18 mm	-
Promedio	-	-	-	17,8 mm	-

A continuación, se presentan imágenes más representativas de los resultados obtenidos del extracto acuoso de *Malva pseudolavatera*.

Escherichia coli

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el antibiograma realizado con el extracto acuoso de Malva pseudolavatera frente a la cepa de E.coli se puede apreciar que no hubo halos de inhibición en ninguna de las concentraciones evaluadas (ver figura 9); mientras que con el antibiótico (cefotaxima) utilizado como control positivo frente a la misma cepa, se pueden observar los respectivos halos de inhibición (ver figura 9.34).

Figura 31 Antibiograma E. coli M. pseudolavatera - E. acuoso 2.5%

Figura 32 Antibiograma E. coli M. pseudolavatera - E. acuoso 5%

Figura 33 Antibiograma E. coli M. pseudolavatera - E. acuoso 10%

Figura 34 Antibiograma E. coli M. pseudolavatera - E. acuoso (Control+)

Figura 9. Antibiograma realizado con el extracto acuoso de Malva pseudolavatera frente a la cepa de E.coli

Staphylococcus aureus

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el antibiograma realizado con el extracto acuoso de Malva pseudolavatera frente a la cepa de S. aureus se puede apreciar que no hubo halos de inhibición en ninguna de las concentraciones evaluadas (ver figura 10); mientras que con el antibiótico (cefotaxima) utilizado como control positivo frente a la misma cepa, se pueden observar los respectivos halos de inhibición (Ver figura 10.38).

Figura 35 Antibiograma S. aureus M. pseudolavatera - E. acuoso 2.5%

Figura 36 Antibiograma S. aureus M. pseudolavatera - E. acuoso 5%

Figura 37 Antibiograma *S. aureus* *M. pseudolavatera* - E. acuoso 10%

Figura 38 Antibiograma *S. aureus* *M. pseudolavatera* - E. acuoso (Control +)

Figura 10. Antibiograma realizado con el extracto acuoso de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *E. coli*

Klebsiella pneumoniae

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el antibiograma realizado con el extracto acuoso de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *K. pneumoniae* se puede apreciar que no hubo halos de inhibición en ninguna de las concentraciones evaluadas (ver figura 11); mientras que con el antibiótico (cefotaxima) utilizado como control positivo frente a la misma cepa, se pueden observar los respectivos halos de inhibición (ver figura 11.42).

Figura 39 Antibiograma *K. pneumoniae* *M. pseudolavatera* - E. acuoso 2.5%

Figura 40 Antibiograma *K. pneumoniae* *M. pseudolavatera* - E. acuoso 5%

Figura 41 Antibiograma *K. pneumoniae* *M. pseudolavatera* - E. acuoso 10%

Figura 42 Antibiograma *K. pneumoniae* *M. pseudolavatera* - E. acuoso (Control +)

Figura 11. Antibiograma realizado con el extracto acuoso de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *K. pneumoniae*

Extracto hidroalcohólico

Los resultados obtenidos por el método de Kirby-Bauer o difusión en disco, a partir del extracto hidroalcohólico con una concentración de 150,7mg/5 mL de *Malva pseudolavatera*, demostraron que a los diferentes volúmenes con sus respectivas concentraciones (0,30mg/10µL, 0,60mg/20µL, 0,90mg/30µL), los microorganismos gram-

negativos (*E. coli* y *K. pneumoniae*) no presentaron halos de inhibición. Por otro lado, el microorganismo gram-positivo (*S. aureus*) no presentó halos de inhibición en las concentraciones 0,30mg/10µ y 0,60mg/20µL; mientras que en la concentración de 0,90mg/30 µL presentó halos de inhibición de 7 mm y 8 mm de diámetro. Se consideró como control positivo la cefotaxima y como control negativo la solución hidroalcohólica (50:50). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 10.

Microorganismos	Concentraciones			Controles	
	0,30 mg/10µL	0,60 mg/20µL	0,90 mg/30µL	C+ (CTX)	C-
<i>E. coli</i>	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	29 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
	-	-	-	30 mm	-
Promedio	-	-	-	29,8 mm	-
<i>S. aureus</i>	-	-	7 mm	28 mm	-
	-	-	7 mm	27 mm	-
	-	-	8 mm	29 mm	-
	-	-	8 mm	28 mm	-
	-	-	7 mm	28 mm	-
Promedio	-	-	7,4 mm	28 mm	-
<i>K. pneumoniae</i>	-	-	-	18 mm	-
	-	-	-	17 mm	-
	-	-	-	18 mm	-
	-	-	-	18 mm	-
	-	-	-	18 mm	-
Promedio	-	-	-	17,8 mm	-

A continuación, se presentan imágenes más representativas de los resultados obtenidos del extracto hidroalcohólico de *Malva pseudolavatera*.

Escherichia coli

Figura 43 Antibiograma *E. coli* *M. pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.30mg/10µl

Figura 44 Antibiograma *E. coli* *M. pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.60mg/20µl

Figura 45 Antibiograma *E. coli* *M. pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.90mg/30µl

Figura 47 Antibiograma *E. coli* *M. pseudolavatera* - E. hidroalcohólico (Control -)

Figura 46 Antibiograma *E. coli* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico (Control +)

Figura 12. Antibiograma realizado con el extracto hidroalcohólico de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *E. coli*

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el antibiograma realizado con el extracto hidroalcohólico de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *E. coli* se puede apreciar que no hubo halos de inhibición en ninguna de las concentraciones evaluadas, ni con la solución hidroalcohólica (50:50) utilizada como control negativo (ver figuras 12); mientras que con el antibiótico (cefotaxima) utilizado como control positivo frente a la misma cepa, se pueden observar los respectivos halos de inhibición (ver figura 12.47).

Staphylococcus aureus

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el antibiograma realizado con el extracto hidroalcohólico de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *S. aureus* se puede apreciar que no hubo halos de inhibición en las concentraciones 0,30mg/10µL, 0,60mg/20µL, ni con la solución hidroalcohólica (50:50) utilizada como control negativo (ver figura 13); mientras que a una concentración de 0,90mg/30µL se apreciaron halos de 7 mm y 8 mm de diámetro (ver figura 13.50) y con el antibiótico (cefotaxima) utilizado como control positivo frente a la misma cepa, se pueden observar los respectivos halos de inhibición (Ver figura 13.51).

Figura 48 Antibiograma *S. aureus* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.30mg/10µl

Figura 49 Antibiograma *S. aureus* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.60mg/20µl

Figura 50 Antibiograma *S. aureus* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.90mg/30µl

Figura 51 Antibiograma *S. aureus* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico (Control +)

Figura 52 Antibiograma *S. aureus* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico (Control -)

Figura 13. Antibiograma realizado con el extracto hidroalcohólico de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *S. aureus* *Klebsiella pneumoniae*

Figura 53 Antibiograma *K. pneumoniae* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.30mg/10µl

Figura 54 Antibiograma *K. pneumoniae* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.60mg/20µl

Figura 55 Antibiograma *K. pneumoniae* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.90mg/30µl

Figura 56 Antibiograma *K. pneumoniae* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico (Control -)

Figura 55 Antibiograma *K. pneumoniae* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico 0.90mg/30µl

Figura 56 Antibiograma *K. pneumoniae* M. *pseudolavatera* - E. hidroalcohólico (Control -)

Figura 14. Antibiograma realizado con el extracto hidroalcohólico de *Malva pseudolavatera* frente a la cepa de *K. pneumoniae*

Resultados: Actividad antioxidante

Método de FRAP (capacidad ferroreductora)

El ensayo FRAP está basado en la habilidad de los compuestos fenólicos para reducir Fe^{3+} a Fe^{2+} . En presencia de 2,4,6-tripiridil-s-triazina, la reducción se encuentra acompañada de la formación de un complejo coloreado de Fe^{2+} de color azul. El extracto a las cinco concentraciones ensayadas mostró desde el punto de vista cualitativo un cambio del color a azul intenso, lo cual es indicativo de la presencia de sustancias antioxidantes en el mismo.

Los resultados expresaron la capacidad reductora del catión Fe^{3+} del extracto como μM equivalentes de ácido ascórbico y μM equivalentes de FeSO_4 (sustancias de referencias utilizadas y reconocidas por tener un alto valor antioxidante), a partir de las curvas de calibración de dichos patrones obtenidas por regresión lineal (figura 15) con sus respectivas ecuaciones, donde Y es la absorbancia y X la concentración.

Figura 15. Curvas de calibración del ácido ascórbico y el FeSO_4 para la determinación de la capacidad antioxidante por FRAP

Se logró una buena correlación entre las concentraciones ensayadas de las sustancias de referencia y las densidades ópticas, con un coeficiente de correlación cercano a 0,99; esto es indicativo del buen ajuste de la ecuación del modelo a los datos experimentales.

En la tabla 9 se muestra la actividad ferro-reductora asociada a los extractos evaluados. Se evidenció actividad antioxidante de manera concentración- dependiente, lográndose en todas las concentraciones ensayadas de los extractos, valores superiores (en equivalentes de ácido ascórbico y FeSO_4) a la menor concentración ensayada (100 μM) de cada sustancia de referencia.

Concentración $\mu\text{g/mL}$	Actividad ferro-reductora $\pm$ DE			
	μM equivalentes de ácido ascórbico		μM equivalentes de FeSO_4	
	Malva silvestre	Malva Pseudolavatera	Malva silvestre	Malva Pseudolavatera
25	348,67/5,47a	341,43/4,35a	112,88/5,13i	106,08/4,08i
50	416,06/9,04b	387,08/9,96c	176,14/8,49j	148,93/9,35k
100	521,14/15,42d	487,08/11,29e	280,42/6,35l	242,81/10,60m
150	651,57/14,14f	635,63/14,79f	397,23/13,27n	382,26/13,88n
200	832,73/19,31g	745,05/7,63h	567,30/18,14o	484,99/7,16p

Nota: se indica la media ($n=3$) $\pm$ desviación estándar (DE). Letras diferentes en un mismo μM equivalente para los dos extractos a la misma concentración indica diferencias significativas y letras iguales que no existen diferencias significativas ($p \leq 0,05$), según t-student

Los resultados permitieron sugerir que el extracto hidroalcohólico de Malva silvestre presenta mayor actividad ferro-reductora que el extracto de Malva pseudolavatera, lo cual se traduce en los altos valores de μM equivalentes expresados en función de las sustancias de referencias ensayadas.

Capacidad secuestradora del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH)

Desde el punto de vista cualitativo se pudo apreciar un cambio de coloración de púrpura a amarillo en ambos extractos conforme iba aumentando la concentración. Esto se debe por la presencia de sustancias antioxidantes

en el extracto que redujeron el radical 2,2-difenil-1-picrihidracilo (DPPH) en conjunto, con la pérdida de absorbancia en la disolución.

Se presentaron diferencias significativas entre las muestras en la mayoría de las concentraciones ensayadas. A la concentración de 100 $\mu\text{g/mL}$, los dos extractos no manifestaron diferencias significativas en los porcentajes de secuestro del radical, con valores superiores al 55 %, aunque menor que las sustancias de referencias. Pero también fue posible observar una buena actividad antioxidante de los dos extractos, ya que a mayor concentración de los extractos hidroalcohólicos de ambas especies se obtuvieron valores superiores al 75 %. Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 10.

Tabla 10. Capacidad secuestradora del radical DPPH de los extractos hidroalcohólicos de *M. sylvestris*, *M. pseudolavatera* y las sustancias de referencias

Concentración $\mu\text{g/mL}$	Porcentaje de secuestro del radical DPPH (%) $\pm$ DE			
	<i>Malva sylvestris</i>	<i>Malva pseudolavatera</i>	Vitamina C	Trolox
25	39,53/1,05a	37,88/0,70b	69,46/0,86c	76,62/0,60d
50	51,10/0,90e	48,19/0,75f	78,47/0,76g	80,07/0,38h
100	61,81/1,80i	59,95/0,92i	82,23/0,43j	83,03/0,83j
150	67,66/0,82k	65,76/1,33l	83,73/0,70m	83,98/0,62m
200	77,82/0,67n	75,22/0,51o	85,68/0,37p	85,73/0,68p

Nota: se indica la media (n=3) $\pm$ desviación estándar (DE). Letras diferentes en una fila indica diferencias significativas y letras iguales que no existen diferencias significativas, a una misma concentración ($p \leq 0,05$), según el test de comparación múltiple de Tukey

A continuación, se muestra en la figura 16, el comportamiento de la capacidad secuestradora del radical DPPH de los extractos hidroalcohólicos de *Malva sylvestris*, *Malva pseudolavatera* y las sustancias de referencias, en donde se puede observar que existe una tendencia al aumento de la capacidad de inhibición de dicho radical a medida que aumenta la concentración.

Figura 16. Comportamiento de la capacidad secuestradora del radical DPPH

Ensayo del ABTS $\bullet+$ (ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina)-6- sulfónico)

Durante el desarrollo de este método, se observó una decoloración del radical catiónico ABTS $\bullet+$ a todas las concentraciones evaluadas, debido a la capacidad del extracto y las sustancias de referencia de neutralizar dicho radical, esto se ve reflejado en un descenso de absorbancia y una disminución del color azul-verde intenso hasta su decoloración.

En la tabla 13 se presentan los porcentajes de inhibición del radical ABTS $\bullet+$ y se apreciaron diferencias significativas entre las muestras ensayadas. Los extractos evidenciaron a la mínima concentración (100 $\mu\text{g/mL}$) una capacidad de secuestro superior al 50 %, incluso superior, a las mismas concentraciones evaluadas para las dos sustancias de referencia. A las concentraciones de 200 y 300 $\mu\text{g/mL}$ los extractos exhibieron mayor porcentaje de inhibición que el Trolox, lo que sugiere una elevada actividad antioxidante.

Tabla 11. Capacidad secuestradora del radical ABTS●+ de los extractos hidroalcohólicos de *Malva sylvestris*, *Malva pseudolavatera* y las sustancias de referencias

Concentración µg/mL	Porcentaje de secuestro del radical ABTS●+ (%) ± DE			
	<i>Malva sylvestris</i>	<i>Malva pseudolavatera</i>	Vitamina C	Trolox
100	52,78/0,44a	50,63/0,72b	44,22/0,66c	37,72/0,73d
200	61,87/0,44e	59,67/0,81f	71,45/0,73g	50,87/0,81h
300	68,51/0,66i	66,17/0,30j	81,86/0,69k	61,43/0,77l
400	79,12/0,37m	77,75/0,34n	90,95/0,83o	84,20/0,66p
500	85,83/0,45q	85,13/0,33q	92,56/0,30r	89,43/0,50s

Nota: se indica la media (n=3) ± desviación estándar (DE). Letras diferentes en una fila indica diferencias significativas y letras iguales que no existen diferencias significativas, a una misma concentración (p≤ 0,05), según el test de comparación múltiple de Tukey

DISCUSIÓN

Actividad antibacteriana

En estudio in vitro para evaluar la actividad antibacteriana de extractos hidroalcohólicos obtenidos por maceración de diferentes plantas, uno de ellos fue proveniente de *Malva sylvestris*, para brindar una alternativa en el tratamiento de la periodontitis.^(41,42) Todos los extractos tuvieron actividad antibacteriana frente al microorganismo estudiado, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, sus halos de inhibición fueron comparados con la clorhexidina al 0,2 % con el protocolo establecido en el CLSI. La actividad antibacteriana más baja (de las 3 plantas estudiadas) fue de *Malva sylvestris*.^(43,44)

En un estudio se realizó la bioactividad de *Malva sylvestris* frente a diferentes patógenos, en donde utilizaron sus hojas y flores para realizar los respectivos extractos (n-hexano, diclorometano y metanol). Sus resultados revelaron que posee actividad antibacteriana en el extracto metanólico frente al *Staphylococcus aureus*, *Erwinia carotovora*, *Streptococcus agalactiae* y *Enterococcus faecalis*, además posee una actividad citotóxica elevada, razón por la cual puede ser usada como un agente antiproliferativo. Finalmente, concluyeron que esta planta puede ser usada como agente antiséptico para eliminar patógenos resistentes a antibióticos.⁽⁴⁵⁾

En un estudio la actividad antibacteriana de diferentes extractos (metanólicos y diclorometánicos) de distintas plantas frente al *Staphylococcus aureus*, dentro de este grupo se encontraba el género *Malva* (*parviflora*). Para el ensayo de la actividad antibacteriana se sometió la cepa del *S. aureus* a una concentración de 10 mg/mL de cada uno de los extractos, dando como resultado para el género de *Malva* en ambos extractos una actividad inhibitoria escasa.^(46,47)

Según el Dr. Jorge Alonso en el Taller de Plantas Medicinales y Atención Primaria de la Salud, llamado “Técnicas de comprobación de actividad terapéutica en plantas medicinales” detalla lo siguiente: Si en los resultados obtenidos, hay halos de inhibición >9 mm es positivo (con actividad), entre 6-9 mm es intermedio (actividad moderada), y <6 mm es negativo (sin actividad), estos valores solo se aplican para extractos vegetales.⁽⁴⁸⁾

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, este género tuvo un comportamiento similar con los distintos microorganismos evaluados en este estudio, ya que en la evaluación de la actividad antibacteriana en el extracto acuoso con diferentes concentraciones (2,5 %, 5 %, 10 %) de *Malva sylvestris*, se pudo observar que con las cepas de *E. coli* y *S. aureus* no presentó actividad, pero se pudo apreciar una moderada actividad frente a la cepa de *K. pneumoniae* a concentraciones de 5 % y 10 %.⁽⁴⁹⁾ En cuanto al extracto hidroalcohólico con concentraciones en base a los volúmenes evaluados, se pudo observar que a una concentración de 0,16 mg/10 µL no presentó actividad frente a las cepas de los microorganismos evaluados, pero a concentraciones de 0,32 mg/20 µL y 0,48mg/30 µL si presentó una moderada actividad frente a las bacterias Gram- negativas.⁽⁵⁰⁾

Por otro lado, los extractos acuosos de *Malva pseudolavatera* con diferentes concentraciones (2,5 %, 5 %, 10 %) frente a las cepas de *E. coli*, *S. aureus* y *K. pneumoniae* no presentaron actividad. En cuanto al extracto hidroalcohólico con concentraciones en base a los volúmenes evaluados, se pudo observar que a las concentraciones de 0,30mg/10 µL y 0,60 mg/20 µL no presentaron actividad frente a ninguna de las cepas de los microorganismos mencionados, pero a la concentración de 0,90 mg/30 µl se pudo apreciar una actividad moderada contra la bacteria Gram-positiva.⁽⁵¹⁾

Actividad antioxidante

En un estudio se realizó una cuantificación de fenoles y flavonoides totales en extractos (metanólicos) naturales de *Malva sylvestris* y otras plantas. En donde dio como resultado una cantidad significativa de compuestos fenólicos los cuales están relacionados con propiedades farmacológicas, como, por ejemplo, reducir el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas.^(52,53,54)

En un estudio se realizó la extracción de polisacáridos de las hojas de *Malva sylvestris* y evaluaron su actividad antioxidante; dando como resultado fuertes actividades de captación in vitro en DPPH y radicales hidroxilos, razón por la cual concluyeron que pueden tener aplicaciones potenciales en las industrias médicas y alimenticias.^(55,56,57)

En un estudio se evaluó la actividad cualitativa y cuantitativa de los pigmentos vegetales (antioxidantes) de *Malva sylvestris* y *Malva moschata*. Se elaboraron extractos de acetona. El análisis cualitativo se realizó por cromatografía de papel y el análisis cuantitativo mediante espectrofotometría.^(58,59) Según los resultados, ambas plantas poseen cantidad significativa de pigmentos vegetales (Clorofila A, Clorofila B y Carotenoides) que pueden desempeñar un papel importante como antioxidantes y como medios anticancerígenos; sin embargo, la especie *moschata* es más eficaz como antioxidante que la especie *sylvestris*.^(60,61)

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, cabe indicar que la evaluación de la actividad antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera* evaluados, mantuvieron un comportamiento similar en este estudio, ya que según los resultados de los tres métodos in vitro realizados, se pudo comprobar que a medida que aumentaba la concentración de los extractos ensayados, la capacidad reductora incrementaba (FRAP) y la actividad antirradicalaria (DPPH y ABTS•+) también, manifestándose de esta manera, una elevada actividad antioxidante.^(62,63)

CONCLUSIONES

Los extractos acuosos de las especies de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, solo presentó moderada actividad antibacteriana la especie *Malva sylvestris* y los extractos hidroalcohólicos de *Malva sylvestris* presentaron moderada actividad sobre *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*, finalmente los extractos hidroalcohólicos de *Malva pseudolavatera* presentaron moderada inhibición frente a *Staphylococcus aureus*.

De los resultados obtenidos en cuanto la evaluación in vitro de los extractos acuosos e hidroalcohólicos sobre los microorganismos se pudo definir que solo presentó actividad los extractos acuosos de *Malva sylvestris* a la concentración de 10 % que presentó un halo de inhibición de 8 mm frente a *Klebsiella pneumoniae*. Por otra parte, los extractos hidroalcohólicos de *M. sylvestris* a las concentraciones (0,16mg/10µL - 0,32mg/20µL y 0,48mg/30µL) presentó moderada inhibición la concentración 0,48mg/30µL con un halo de 7 mm frente a

E. coli y *K. pneumoniae* y los extractos hidroalcohólicos de *M. pseudolavatera* (0,30 mg/10µL - 0,60 mg/20µL y 0,90 mg/30µL), se observó que presentaron moderada inhibición a la concentración de 0,90 mg/30µL frente a *S. aureus*, según lo indica el Dr. Jorge Alonso en el taller de plantas medicinales “técnicas de comprobación de acción terapéutica”.

La actividad antioxidante de los extractos hidroalcohólicos fue evaluada por tres métodos que presentan múltiples mecanismos, los métodos DPPH y ATBS se basan en la eliminación de ciertos radicales y el método FRAP mide el potencial de actividad de reducción férrica, teniendo en consideración los resultados de los tres métodos in vitro ensayados se pudo constatar que a medida que aumentaba la concentración de los extractos, aumentaba el poder reductor (ensayo FRAP) y la actividad antirradicalaria (ensayos DPPH y ATBS, manifestando una elevada actividad antioxidante.

RECOMENDACIONES

Evaluar la actividad antibacteriana de *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*, utilizando diferentes microorganismos y empleando otro solvente para la obtención de sus extractos. Realizar nuevos ensayos sobre la actividad antibacteriana y antioxidante, utilizando como muestra otros órganos de la planta *Malva sylvestris* y *Malva pseudolavatera*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alonso J. Técnicas de comprobación de actividad terapéutica de las plantas medicinales [Internet]. 2002 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/mednat/comprobacion_de_la_actividad_terapeutica_de_las_plantas.pdf
2. Andrade V, Silva J. Caracterización de *Klebsiella pneumoniae* productora de la β-lactamasa SHV-5 en una unidad de cuidados intensivos. *Salud Publica Mex.* 2004;46(6):524-8.
3. Avello M, Suwalsky M. Radicales libres, antioxidantes naturales y mecanismos de protección. *Atenea.* 2006;2(494):161-72.
4. Barros L, Carvalho AM, Ferreira IC. Leaves, flowers, immature fruits and leafy flowered stems of *Malva sylvestris*: a comparative study of the nutraceutical potential and composition. *Food Chem Toxicol.* 2010;48(6):1466-72.

5. Basualdo J, Coto C, Torres R. Antibióticos y antimicrobianos [Internet]. Agrovvet Market Animal Health; 2007 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <https://www.agrovvetmarket.com/investigacion-salud-animal/pdf-download/antibioticos-y-antimicrobianos>
6. Bautista L. Contribución al estudio de flavonoides en hojas y determinación de la actividad antioxidante en *Chromolaena tacotana* [Internet]. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A); 2017 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/720/1/tesis%20C.tacotana%2031-08-2017.pdf>
7. Bush LM. Infecciones por *Staphylococcus aureus* [Internet]. Manual MSD; 2015 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas/infecciones-por-staphylococcus-aureus#v784042_es
8. Cervantes E, García R, Salazar P. Características generales del *Staphylococcus aureus*. *Rev Latinoam Patol Clin Med Lab*. 2014;61(1):28-40.
9. Cheng C, Wang Z. Bacteriostatic activity of anthocyanin of *Malva sylvestris*. *J For Res*. 2006;17(1):83-5.
10. CLSI. Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio [Internet]. 2019 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <https://clsi.org/about/about-clsi/>
11. Cogo LL, Monteiro CL, Miguel MD, Miguel OG, Cunico MM, Ribeiro ML. Anti-*Helicobacter pylori* activity of plant extracts traditionally used for the treatment of gastrointestinal disorders. *Braz J Microbiol*. 2010;41(2):304-9.
12. Coronado M, Vega S, Vasquez M. Antioxidantes: perspectiva actual para la salud humana. *Rev Chil Nutr*. 2015;42(2):206-12.
13. Corrales LC, Muñoz MM. Estrés oxidativo: origen, evolución y consecuencias de la toxicidad del oxígeno. *Rev Cienc Bioméd*. 2012;10(18):135-50.
14. DellaGreca A, Cutillo F, Abrosca B, Fiorentino A, Zarrelli A. Antioxidant and radical scavenging properties of *Malva sylvestris*. *Nat Prod Commun*. 2009;4:893-6.
15. Dipak P. A review on biological activities of common mallow (*Malva sylvestris* L.). *Innovare J Life Sci*. 2016;4(5):1-5.
16. Dolatkhahi M, Dolatkhahi A, Nejad J. Ethnobotanical study of medicinal plants used in Arjan-Parishan protected area in Fars Province of Iran. *Avicenna J Phytomed*. 2014;4(6):402-12.
17. Dulger B, Gonuz A. Antimicrobial activity of some Turkish medicinal plants. *Pak J Biol Sci*. 2004;7(9):1559-62.
18. Echeverri LM, Cataño JC. *Klebsiella pneumoniae* como patógeno intrahospitalario: epidemiología y resistencia. *Iatreia*. 2010;23(3):240-9.
19. Elsagh M, Fartookzade MR, Kamalinejad M, Anushiravani M, Feizi A, Behbahani FA, et al. Efficacy of the *Malva sylvestris* L. flowers aqueous extract for functional constipation: a placebo-controlled trial. *Complement Ther Clin Pract*. 2015;21(2):105-11.
20. Esparza MJ. Descripción general de los principales grupos de fármacos antimicrobianos. Antibióticos [Internet]. 2008 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <https://guia-abe.es/generalidades-descripcion-general-de-los-principales-grupos-de-farmacos-antimicrobianos-antibioticos->
21. Faner R, Sibila O, Agustí A, Bernasconi E, Chalmers J, Huffnagle G, et al. The microbiome in respiratory medicine: current challenges and future perspectives. *Eur Respir*. 2017;49(4):1-12.
22. Gallegos M. Las plantas medicinales: principal alternativa para el cuidado de la salud, en la población rural de Babahoyo, Ecuador. *An Fac Med*. 2016;77(4):327-32.

23. Gasparetto JC, Ferreira CA, Hayashi SS, Otuky MF, Pontarolo R. Ethnobotanical and scientific aspects of *Malva sylvestris* L.: a millennial herbal medicine. *J Pharm Pharmacol*. 2011;64:172-89.
24. Gerra E. Estrés oxidativo, enfermedades y tratamientos antioxidantes. *An Med Interna*. 2001;18(6):50-9.
25. Gracia MA. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales en extractos naturales [Internet]. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro; 2007 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: https://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias-2007/56_1UAQGarciaNava.pdf
26. Jaradet NA, Abualhasan MN, Ali LA. Comparison of anti-oxidant activities and exhaustive extraction yields between wild and cultivated *Cyclamen persicum*, *Malva sylvestris*, and *Urtica pilulifera* leaves. *J Appl Pharm Sci*. 2015;5(4):101-6.
27. Lespada M, Córdova E, Roca V, Gómez N. Bacteriemia por *Klebsiella pneumoniae* productora de carbapenemasa tipo KPC: estudio comparativo y evolución en 7 años. *Rev Soc Esp Quimioter*. 2019;32(1):15-21.
28. López JA, Echeverri LM. *K. pneumoniae*: ¿la nueva “superbacteria”? Patogenicidad, epidemiología y mecanismos de resistencia. *latreia*. 2010;23(2):157-65.
29. Loza EH. Uso de antibióticos en infecciones de piel y partes blandas en niños de 1 a 5 años internados en el servicio de Infectología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, de la ciudad de Quito, periodo de agosto 2015 a agosto 2016 [tesis en Internet]. Quito: Universidad Central del Ecuador; 2017 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/bitstream/25000/11199/1/T-UCE-0006-020-2017.pdf>
30. Macías ET. Extracción y cuantificación de compuestos fenólicos en cáscara de rambután (*Nephelium lappaceum* L.) de dos variedades (dulce y amarga) [tesis en Internet]. Guayaquil: Universidad de Guayaquil; 2019 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/39960/1/BCIEQ-T-0372%20Mac%C3%ADas%20Torres%20Evelyn%20Tiffany.pdf>
31. Macri M, Kaler M. Guía de medicamentos esenciales para el PNA antimicrobianos [Internet]. Ministerio de Salud Presidencia de la Nación; 2017 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000001087cnt-medicamentos-esenciales-primer-nivel-atencion-antimicrobianos.pdf>
32. Malik SN, Mohammed HJ, Misak JA. Screening of antibacterial properties for some Iraqi plants against *Salmonella typhimurium*. *Iraqi J Vet Med*. 2011;35(2):28-35.
33. Mercado G, De la Rosa L. Compuestos polifenólicos y capacidad antioxidante de especias típicas consumidas en México. *Nutr Hosp*. 2013;1-11.
34. Mesa A, Zapata S, Arana L. Actividad antioxidante de extractos de diferente polaridad de *Ageratum conyzoides* L. *Bol Latinoam Caribe Plantas Med Aromat*. 2015;14(1):1-10.
35. Molina J, Eslava CA. *Escherichia coli* diarrogénica [Internet]. Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM; 2015 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/escherichia-coli.html>
36. Mosquito S, Ruiz J, Bauer JL, Ochoa TJ. Mecanismo moleculares de resistencia antibiótica en *Escherichia coli* asociadas a diarrea. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2011;28(4):648-56.
37. Organización Mundial de la Salud (OMS). 10 datos sobre la resistencia a los antimicrobianos [Internet]. OMS; 2017 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/antimicrobial_resistance/es/
38. Organización Mundial de la Salud (OMS). Las 10 principales causas de defunción [Internet]. OMS; 2018 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
39. Ouldieroukarima RS, Belhocine A, Mekness A, Meddah B, Tirtouil A. Phytochemical and antioxidant study of *Malva sylvestris* from the west of Algeria. *Glob Adv Res J Microbiol*. 2017;6(5):30-2.

40. Peñarrieta M, Tejada L, Mollinedo P. Compuestos fenólicos y su presencia en alimentos. *Rev Boliv Quim.* 2014;31(2):68-81.
41. Picazo JJ. Métodos básicos para el estudio de sensibilidad a los antimicrobianos [Internet]. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica; 2000 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia11.pdf>
42. Quizhpe A, Murray M, Muñoz G, Peralta J, Calle K. Recuperar la salud integral y la armonía de los ecosistemas, para contener la resistencia bacteriana a los antibióticos [Internet]. *React Latinoamérica*; 2011 [citado el 12 Oct 2023].
43. Ramírez R, Mojica D, Espitia M. Actividad antibacteriana de extractos de plantas provenientes del área rural de Soracá contra *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SARM). *Rev Cienc Salud.* 2015;7(1):4-12.
44. Razavi S, Zarrini G, Molavi G, Ghasemi G. Bioactivity of *Malva sylvestris* L., a medicinal plant from Iran. *J Basic Med Sci.* 2011;14(6):574-9.
45. Redzic S, Hodzic N, Tuka M. Pigmentos vegetales (antioxidantes) de plantas medicinales *Malva sylvestris* L. y *Malva moschata* L. (Malvaceae). *Bosn J Basic Med Sci.* 2005;5(2):53-8.
46. Rodríguez G. Principales características y diagnóstico de los grupos patógenos de *Escherichia coli*. *Salud Publica Mex.* 2002;44(5):465-75.
47. Rojo V, Vázquez P, Reyes LP, Cervero M. Factores de riesgo y evolución clínica de las infecciones causadas por *Klebsiella pneumoniae* productora de carbapenemasas en un hospital universitario de España: estudio de casos y controles. *Rev Esp Quimioter.* 2018;31(5):427-34.
48. Samatavi V, Manoochehrizade A. Polisacárido extracción de *Malva sylvestris* y su actividad antioxidante. *Int J Biol Macromol.* 2013;60:427-36.
49. Santamaría EJ. Comprobación del efecto cicatrizante de los extractos hidroalcohólicos de *Malva sylvestris* L. y aguacate (*Persea americana*) en ratones (*Mus musculus*) [Internet]. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; 2013 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://dspace.epoch.edu.ec/bitstream/123456789/3231/1/56T00411.pdf>
50. Seija V, Vignoli R. Principales grupos de antibióticos [Internet]. *Bacteriología y virología médica*; 2016 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/BacteCEFA34.pdf>
51. Terrain. *Malva pseudolavatera* (Small tree mallow) [Internet]. Taranaki Educational Resource Research Analysis and Information Network; 2018 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <http://www.terrain.net.nz/friends-of-te-henui-group/weeds-by-scientific-names/mallow-malva-linnaei-cretan-mallow.html>
52. Tortora G, Funke B, Case C. El mundo microbiano y usted. En: Tortora G, Funke B, Case C, editores. *Introducción a la microbiología*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2015. p. 2-24.
53. Vahabi S, Hakemi-Vala M, Gholami S. In vitro antibacterial effect of hydroalcoholic extract of *Lawsonia inermis*, *Malva sylvestris*, and *Boswellia serrata* on *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. *Adv Biomed Res.* 2019;8(1):8-22.
54. Venereo J. Daño oxidativo, radicales libres y antioxidantes. *Rev Cubana Med Mil.* 2002;31(2):126-33.
55. Walter C, Shinwari Z, Afzal I, Malik R. Antibacterial activity in herbal products used in Pakistan. *Pak J Bot.* 2011;43:155-62.
56. World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance: global report on surveillance [Internet]. Geneva: WHO; 2014 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112642/9789241564748_eng.pdf?sequence=1

57. World Health Organization (WHO). Escherichia coli [Internet]. Geneva: WHO; 2018 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: https://www.who.int/topics/escherichia_coli_infections/es/

58. World Health Organization (WHO). Resistencia a los antibióticos [Internet]. Geneva: WHO; 2018 [citado el 12 Oct 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antibioticos>

59. Zambrano L, Buenaño M, Mancera N, Jiménez E. Estudio etnobotánico de plantas medicinales utilizadas por los habitantes del área rural de la parroquia San Carlos, Quevedo, Ecuador. Univ Salud. 2015;7(1):97-111.

60. Zamora JD. Antioxidantes: micronutrientes en lucha por la salud. Rev Chil Nutr. 2007;34(1):17-26.

61. Zendeja G, Avalos H, Soto M. Microbiología general de Staphylococcus aureus: generalidades, patogenicidad y métodos de identificación. Rev Biomédica. 2014;25(2):129-43.

62. Zendejas G, Ávalos H, Soto M. Microbiología general de Staphylococcus aureus: generalidades, patogenicidad y métodos de identificación. Rev Biomédica. 2014;25(3):129-43.

63. Zohea F, Meriem S, Samira S. Fatty acids profile and antimicrobial activities of the seed oil of Malva sylvestris L. from Algeria. Int J Chem. 2013;1(2):233-5.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Curación de datos: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Análisis formal: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Investigación: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Metodología: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Administración del proyecto: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Recursos: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Software: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Supervisión: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Validación: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Visualización: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Redacción - borrador original: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.

Redacción - revisión y edición: Yesenia Anabell Abrigo Alvarado, Nixon Michael Goyes García, Patricia Jiménez Granizo, Glenda Sarmiento Tomalá.